







Fatores associados à reinternação em até 30 dias após a alta e à mortalidade intra-hospitalar após cirurgia por fratura do fêmur proximal em idosos: coorte retrospectiva*

Factors Associated with Readmission within 30 Days after Discharge and In-Hospital Mortality after Proximal Femoral Fracture Surgery in the Elderly: Retrospective Cohort

Alex Fabiano Dias Pinto¹ Clarissa Moreira Teatini¹ Núbia Carelli Pereira de Avelar² Amanda Aparecida Oliveira Leopoldino² Isabel Cristina Gomes Moura³

Rev Bras Ortop 2023;58(2):222-230.

Endereço para correspondência Isabel Cristina Gomes Moura, PhD, Alameda Ezequiel Dias, 275-Santa Efigênia, 30130-110, Belo Horizonte, MG, Brasil (e-mail: icgomes04@yahoo.com.br).

Resumo

Objetivo Avaliar os fatores associados à reinternação em até 30 dias após a alta (R30) e à mortalidade intra-hospitalar (MIH) em idosos submetidos a cirurgia por fratura do fêmur proximal (FFP).

Métodos Coorte retrospectiva com dados de 896 prontuários de idosos (≥ 60 anos) submetidos a cirurgia de FFP em hospital brasileiro, no período entre novembro de 2014 a dezembro de 2019. Os pacientes incluídos foram acompanhados desde a data de internação para a cirurgia até 30 dias após a alta. Como variáveis independentes, foram avaliados o sexo, idade, estado civil, hemoglobina (Hb) pré e pós-operatória, razão normalizada internacional, tempo da internação relacionada à cirurgia, tempo porta cirurgia, comorbidades, cirurgias prévias, uso de medicamentos e escore da American Society of Anesthesiologists (ASA).

Resultados A incidência de R30 foi de 10,2% (intervalo de confiança [IC] 95%: 8,3-12,3%) e a de MIH foi 5,7% (IC95%: 4,3-7,4%). Referente a R30, no modelo ajustado, associaram-se ter hipertensão (odds ratio [OR]: 1,71; IC95%: 1,03-2,96), uso regular de

- ▶ idoso
- ► fraturas do fêmur
- ► readmissão do paciente
- mortalidade

recebido 18 de Fevereiro de 2022 aceito 18 de Outubro de 2022

DOI https://doi.org/ 10.1055/s-0043-1768624. ISSN 0102-3616.

© 2023. Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. All rights reserved.

This is an open access article published by Thieme under the terms of the Creative Commons Attribution-NonDerivative-NonCommercial-License, permitting copying and reproduction so long as the original work is given appropriate credit. Contents may not be used for commercial purposes, or adapted, remixed, transformed or built upon. (https://creativecommons.org/ licenses/by-nc-nd/4.0/)

Thieme Revinter Publicações Ltda., Rua do Matoso 170, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20270-135, Brazil

¹ Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG,

²Departamento de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina. Araranguá, SC, Brasil

³ Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil

Palavras-chave

Trabalho desenvolvido no Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, SC, Brasil.

medicamentos psicotrópicos (OR: 1,74; IC95%: 1,12–2,72). Tratando-se da MIH, maiores chances estiveram associadas à doença renal crônica (DRC) (OR: 5,80; IC95%: 2,64–12,31), maior tempo de internação (OR: 1,06; IC95%: 1,01–1,10) e R30 (OR: 3,60; IC95%: 1,54–7,96). Maiores valores de Hb pré-operatória associaram-se à menor chance de mortalidade (OR: 0,73; IC95%: 0,61–0,87).

Conclusão Os achados sugerem que a ocorrência destes desfechos está associada à comorbidades, medicamentos e Hb.

Abstract

Objective To evaluate the factors associated with readmission within 30 days after discharge (R30) and in-hospital mortality (IHM) in elderly patients undergoing proximal femur fracture surgery (PFF).

Methods Retrospective cohort with data from 896 medical records of elderly (\geq 60 years) patients submitted to PFF surgery in a Brazilian hospital between November 2014 and December, 2019. The patients included were followed-up from the date of hospitalization for surgery up to 30 days after discharge. As independent variables, we evaluated gender, age, marital status, pre- and postoperative hemoglobin (Hb), international normalized ratio, time of hospitalization related to the surgery, doorsurgery time, comorbidities, previous surgeries, use of medications, and the American Society of Anesthesiologists (ASA) score.

Results The incidence of R30 was 10.2% (95% confidence interval [CI]: 8.3–12.3%), and the incidence of IHM was 5.7% (95%CI: 4.3–7.4%). Regarding R30, hypertension (odds ratio [OR]: 1.71; 95%CI: 1.03–2.96), and regular use of psychotropic drugs (OR: 1.74; 95%CI: 1.12–2.72) were associated in the adjusted model. In the case of IHM, higher chances were associated with chronic kidney disease (CKD) (OR: 5.80; 95%CI: 2.64–12.31), longer hospitalization time (OR: 1.06; 95%CI: 1.01–1.10), and R30 (OR: 3.60; 95%CI: 1.54–7.96). Higher preoperative Hb values were associated with a lower chance of mortality (OR: 0.73; 95%CI: 0.61–0.87).

Keywords

- aged
- femoral fractures
- patient readmission
- mortality

Conclusion Findings suggest that the occurrence of these outcomes is associated with comorbidities, medications, and Hb.

Introdução

As fraturas do fêmur proximal (FFPs) tendem a ser cada vez mais comuns em idosos devido ao fenômeno de transição epidemiológica provocado pelo aumento das condições crônico-degenerativas. As FFPs estão entre as condições de saúde mais prevalentes e representam um grande impacto para a saúde pública devido aos declínios funcionais que provocam na vida dos idosos. ¹⁻³ Trata-se de uma condição relacionada a altas taxas de mortalidade e incapacidade e representa a segunda maior causa de hospitalização. ⁵

Estima-se que haverá $\sim 2,6$ milhões de casos de FFP no mundo em 2025, e este número poderá estar entre 4,5 e 6,26 milhões em 2050. 5,6 A incidência de FFP no mundo chega a quase 600 fraturas por 100.000 habitantes 7 e, no Brasil, são relatadas incidências de 194,6 a 215,3 por 100.000 habitantes. 8,9 Considerando a relevância do assunto, métricas como a reinternação em até 30 dias após a alta (R30) e a mortalidade intra-hospitalar (MIH) após a cirurgia por FFP são de grande interesse.

Um estudo italiano relatou taxa de R30 de 45,6% após cirurgia por FFP. ¹⁰ Fatores associados à reinternação citados na literatura são sexo feminino, escore da American Society

of Anesthesiologists (ASA), status funcional, comorbidades, escore Charlson, alcoolismo, atraso para realizar a cirurgia e artroplastia total de quadril prévia. 10-12

No Brasil, a mortalidade pós-cirurgia varia de 4,3% a 7,5%.^{8,13} Apesar da FFP ser mais frequente em mulheres, a mortalidade é maior entre os homens.⁸ Os preditores de mortalidade descritos na literatura são sexo, etnia, atraso na cirurgia, sarcopenia, maiores escores ASA, comorbidades, tempo de internação, escore Charlson, institucionalização e perda de peso.^{1,2,13–15}

Considerando a alta incidência das FFPs no idoso, o grande impacto na saúde pública e diante do desafio de particularizar a assistência ao perfil dos pacientes devido aos poucos estudos realizados no Brasil, o presente estudo tem como objetivo avaliar os fatores associados à R30 e à MIH após cirurgia por FFP em idosos em um hospital privado brasileiro.

Material e Métodos

Estudo de coorte retrospectivo com análise de dados de prontuários em um hospital da rede privada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram incluídos pacientes admitidos por FFP com idade ≥ 60 anos submetidos a tratamento cirúrgico realizado entre novembro de 2014 e dezembro de 2019. Os pacientes foram acompanhados desde a data de internação até 30 dias após a alta. Os casos com registros incompletos, os pacientes que apresentaram fraturas proximais de fêmur oncológicas e os pacientes que apresentavam outras fraturas associadas à do terço proximal do fêmur foram excluídos.

As variáveis dependentes avaliadas foram a R30 e a MIH, definida como o óbito durante o período de internação ou de reinternação em até 30 dias. Como variáveis independentes, foram analisadas características sociodemográficas como sexo, idade e estado civil. Aspectos clínicos também foram levantados: tempo porta cirurgia em horas, tempo de internação em dias, hemoglobina pré- e pós-operatória em g/dL, razão normalizada internacional (RNI), comorbidades como hipertensão, diabetes mellitus, doença renal crônica (DRC), doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, distúrbios psiquiátricos, doenças neurológicas e doenças endócrinas; uso de medicamentos como anti-hipertensivos, antidiabéticos orais e insulinas, antieméticos/antissecretores, psicotrópicos, neurolépticos e anticoagulantes; cirurgias prévias como cardiovasculares, fratura de fêmur, câncer, abdominal ou outras. Foram também descritos o tipo de fratura e o procedimento cirúrgico realizado e o escore ASA.

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 21 de setembro de 2020 sob o parecer número 4.290.194. Foi solicitada a dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido por se tratar de um estudo retrospectivo e resguardando o compromisso com a confidencialidade das informações.

Tamanho da Amostra

O tamanho da amostra foi calculado para se testar a proporção de MIH de idosos por FFP. Considerando um nível de significância de 5% e poder mínimo de 80%, para se testar uma proporção com diferença mínima de 4% para a encontrada em estudo de referência 16 de 10,03%, seriam necessários pelo menos 591 idosos na amostra. Historicamente, o hospital operava em média 240 idosos com FFP por ano.

Análise Estatística

As variáveis qualitativas foram apresentadas como frequências absolutas e relativas, e as quantitativas como média \pm desvio-padrão (DP) (mediana). As variáveis quantitativas foram submetidas ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk.

Para avaliação dos fatores associados aos desfechos, foram utilizados modelos de regressão logística. As variáveis com p < 0.20 na análise univariada foram incluídas em um modelo saturado, e adotando-se a estratégia *backward*, chegou-se ao modelo final, no qual foi mantida a idade independente de significância para controle. A qualidade do ajuste foi avaliada pelo teste de Hosmer-Lemeshow. Os resultados foram apresentados como odds ratio (OR) e respectivos intervalos de confiança (ICs) de 95%. As análises foram realizadas no programa R versão 4.0.5 (R Foundation, Viena, Áustria) e valores-p < 0,05 foram considerados significativos.

Resultados

De 947 prontuários de pacientes elegíveis para o estudo, 51 foram excluídos por serem de pacientes com outras fraturas. A amostra analisada foi de 896 idosos submetidos a cirurgia por FFP. Houve predominância do sexo feminino (77,9%) e a idade média foi 83.4 ± 8.3 anos, sendo que 45.9% tinham entre 80 e 89 anos. Em relação ao estado civil, 41.8% eram viúvos e 36.6% casados (\succ Tabela 1).

Tabela 1 Caracterização sociodemográfica e clínica dos idosos com fratura do fêmur proximal submetidos a procedimento cirúrgico em hospital da rede privada de Belo Horizonte (n = 896)

Características	n válido	Estatísticas
Sociodemográficas		
Sexo	896	
F		698 (77,9)
M		198 (22,1)
Idade (anos)	896	83,4 ± 8,3 (85,0)
60 a 69		68 (7,6)
70 a 79		202 (22,5)
80 a 89		411 (45,9)
≥ 90		215 (24,0)
Estado civil	892	
Casado		326 (36,6)
Separado		35 (3,9)
Solteiro		158 (17,7)
Viúvo		373 (41,8)
Clínicas		
Tempo porta cirurgia (horas)	895	11,9 ± 7,9 (10,6)
Tempo de internação (dias)	896	4,8 ± 4,8 (3,5)
Reinternação em até 30 dias após a alta	890	91 (10,2)
Mortalidade intra-hospitalar	879	50 (5,7)
Hemoglobina pré-operatória	823	12,3 ± 1,7 (12,5)
Hemoglobina pós-operatória	840	9,7 ± 1,8 (9,6)
RNI	806	1,2 ± 0,5 (1,1)
Tipo de fratura	896	
Fratura pertrocantérica		797 (88,9)
Fratura de colo de fêmur		99 (11,1)
Procedimento realizado	896	
Artroplastia		18 (2,0)
Osteossíntese		878 (98,0)
Comorbidades		
Hipertensão	885	603 (68,1)
Diabetes mellitus	885	178 (20,1)

Tabela 1 (Continued)

Características	n	Estatísticas
	válido	
Doença renal crônica	885	75 (8,5)
Doenças respiratórias	885	57 (6,4)
Doenças cardiovasculares	885	320 (36,2)
Distúrbios psiquiátricos	885	83 (9,4)
Doenças neurológicas	885	165 (18,6)
Doenças endocrinológicas	885	164 (18,5)
Medicamentos		
Anti-hipertensivos	840	563 (67,0)
Psicotrópicos	840	365 (43,5)
Antieméticos, antisecretores	840	175 (20,8)
Antidiabéticos orais e insulinas	840	152 (18,1)
Anticoagulantes	840	97 (11,0)
Neurolépticos	840	64 (7,2)
Cirurgias prévias	896	
Cardiovasculares		84 (9,4)
Fratura de fêmur		37 (4,1)
Câncer		21 (2,3)
Abdominal		90 (10,1)
Outras cirurgias		117 (13,1)
ASA	892	
1		46 (5,2)
2		546 (61,2)
3		261 (29,3)
4		39 (4,4)

Abreviação: RNI, razão normalizada internacional.

O tempo médio porta cirurgia foi de 11.9 ± 7.9 horas, o tempo médio de internação foi de 4.8 ± 4.8 dias. A incidência de R30 foi de 10.2%, e a de MIH foi de 5.7%. Os valores médios de hemoglobina pré e pós-operatória foram 12.3 ± 1.7 g/dL e 9.7 ± 1.8 g/dL, respectivamente, e os da RNI foram 1.2 ± 0.5 (\sim Tabela 1).

As fraturas pertrocantéricas representaram 88,9% dos casos e as fraturas de colo de fêmur 11,1%. Osteossíntese foi realizada em 98,0% dos casos, sendo que, quando aplicadas aos casos de fraturas troncatéricas, foram fixadas com implantes intramedulares, e nos casos de fraturas de colo, com parafusos canulados. Todas as artroplastias realizadas foram artroplastias totais do quadril. As comorbidades mais comuns foram hipertensão (68,1%), doenças cardiovasculares (36,2%) e diabetes mellitus (20,1%), sendo que em todos os pacientes diabéticos foi realizado controle glicêmico. Os grupos de medicamentos mais utilizados foram anti-hipertensivos (67,0%) e psicotrópicos (43,5%). O uso de anticoagulante não interferiu na realização da cirurgia. Sobre cirurgias prévias, 10,1% realizaram cirurgias abdominais e

9,4% cirurgias cardiovasculares. O escore ASA 2 foi relatado para 61,2% dos pacientes (**>Tabela 1**).

Reinternação em até 30 dias após a alta

Na análise univariada, associaram-se à maior chance de R30 a hipertensão (OR: 1,77; 95%CI: 1,07–3,04) e o uso de medicamentos antieméticos/antissecretores (OR: 1,71; 95%CI: 1,04–2,75) e psicotrópicos (OR: 1,68; 95%CI: 1,08–2,61) (**Tabela 2**). No modelo multivariado ajustado por idade, associaram-se a maior chance de R30 a hipertensão arterial (OR: 1,71; 95%CI: 1,03–2,96) e uso de medicamentos psicotrópicos (OR: 1,74; 95%CI: 1,12–2,72) (**Tabela 3**).

Mortalidade Intra-hospitalar

Na análise univariada, apresentaram maiores chances de MIH o aumento da idade (OR: 1,05; 95%CI: 1,0-1,09), aumento no tempo de internação (OR: 1,07; 95%CI: 1,03-1,12), reinternação em até 30 dias após a alta (OR: 2,64; 95% CI: 1,24-5,19) e doença renal crônica (OR: 7,05; 95%CI: 3,41-14,10). O aumento dos valores de hemoglobina pré- e pósoperatória associaram-se a menor chance de MIH (OR: 0,73; 95%CI: 0,62-0,85 para hemoglobina pré-operatória e OR: 0,70; 95%CI: 0,58–0,84 para hemoglobina pós-operatória) (>Tabela 4). No modelo final ajustado por idade, representaram maior chance de MIH ter doença renal crônica (OR: 5,80; 95%CI: 2,64–12,31), aumento no tempo de internação (OR: 1,06; 95%CI: 1,01-1,10), reinternação em até 30 dias após a alta (OR: 3,60; 95%CI: 1,54-7,96), e à menor chance o aumento da hemoglobina pré-operatória (OR: 0,73; 95%CI: 0,61-0,87) (►Tabela 3).

Discussão

As FFPs nos idosos representam um problema de saúde pública em todo o mundo devido à alta incidência, morbidade e mortalidade. Apesar do grande número de estudos abordando o tema, o conhecimento sobre as realidades regionais contrastadas ao que já está estabelecido na literatura podem auxiliar em estratégias mais acuradas no cuidado a esses pacientes. No presente estudo, foram observadas incidências de 10,2% de R30 e de 5,7% de MIH em pacientes com FFP submetidos a tratamento cirúrgico. A hipertensão somada ao uso de medicamentos psicotrópicos aumentou a chance de R30. Associaram-se à maior chance de MIH ter DRC, maior tempo de internação e R30, sendo que o aumento da Hb pré-operatória se associou à menor chance de MIH. Estes achados sugerem que a presença de comorbidades como hipertensão e DRC estão relacionadas aos desfechos, e possivelmente outras que motivem o uso regular de medicamentos psicotrópicos, além de maiores valores de Hb pré-operatória.

Perfil da Amostra

No presente estudo, observou-se 77,9% de pacientes do sexo feminino. A predominância de sexo feminino entre os idosos com FFP é bem descrita na literatura. A idade média dos indivíduos avaliados no presente estudo foi de $83,4\pm8,3$ anos, sendo $83,9\pm8,2$ anos para as mulheres e $81,4\pm8,5$

Tabela 2 Associação entre as características dos pacientes e a reinternação em até 30 dias após a alta

Características	Reinternação em até 30 dias após a alta			
	Não (n = 799)	Sim (n = 91)	OR (IC95%)	
Sexo				
F	624 (78,1)	69 (75,8)	0,88 (0,54-1,49)	0,621
М	175 (21,9)	22 (24,2)	_	_
Idade (anos)	83,2 ± 8,4 (85,0)	84,5 ± 7,4 (85,5)	1,02 (0,99–1,05)	0,184
60 a 69	64 (8,0)	4 (4,4)	_	-
70 a 79	177 (22,2)	23 (25,3)	2,08 (0,76-7,29)	0,192
80 a 89	369 (46,2)	40 (44,0)	1,73 (0,67–5,92)	0,309
≥ 90	189 (23,7)	24 (26,4)	2,03 (0,75–7,11)	0,205
Estado civil				
Casado	291 (36,6)	34 (36,3)	_	_
Separado	33 (4,2)	2 (2,2)	0,53 (0,08-1,87)	0,404
Solteiro	145 (18,2)	12 (13,2)	0,73 (0,35–1,42)	0,371
Viúvo	326 (41,0)	44 (48,4)	1,19 (0,74–1,93)	0,475
Tempo de internação (dias)	4,8 ± 5,0 (3,5)	4,5 ± 3,2 (3,7)	0,99 (0,93-1,03)	0,671
Tempo espera cirurgia (horas)	12,0 ± 7,9 (11,1)	10,9 ± 8,3 (8,9)	0,98 (0,96–1,01)	0,223
Hemoglobina pré-operatória	12,3 ± 1,7 (12,5)	12,2 ± 1,7 (12,1)	0,94 (0,82–1,07)	0,326
Hemoglobina pós-operatória	9,8 ± 1,8 (9,7)	9,6 ± 1,7 (9,6)	0,96 (0,85–1,09)	0,540
RNI	1,2 ± 0,5 (1,1)	1,2 ± 0,4 (1,1)	0,80 (0,39–1,35)	0,479
Tipo de fratura				
Pertrocantérica	705 (88,2)	86 (94,5)	2,29 (0,99–6,64)	0,079
Colo de fêmur	94 (11,8)	5 (5,5)	_	_
Procedimento realizado				
Artroplastia	17 (2,1)	1 (1,1)	_	_
Osteossíntese	782 (97,9)	90 (98,9)	1,96 (0,39–35,46)	0,517
Comorbidades				
Hipertensão	526 (66,8)	71 (78,0)	1,77 (1,07–3,04)	0,031
Diabetes mellitus	161 (20,4)	14 (15,4)	0,71 (0,38–1,25)	0,256
Doença renal crônica	65 (8,2)	10 (11,0)	1,37 (0,64–2,67)	0,377
Doenças respiratórias	55 (7,0)	2 (2,2)	0,30 (0,05-1,00)	0,098
Doenças cardiovasculares	285 (36,2)	34 (37,4)	1,05 (0,67–1,64)	0,822
Distúrbios psiquiátricos	74 (9,4)	9 (9,9)	1,06 (0,48-2,09)	0,877
Doenças neurológicas	143 (18,1)	20 (22,0)	1,27 (0,73–2,12)	0,374
Doenças endocrinológicas	147 (18,7)	14 (15,4)	0,79 (0,42-1,40)	0,446
Medicamentos				
Anti-hipertensivos	493 (66,4)	64 (70,3)	1,20 (0,76–1,96)	0,448
Antidiabéticos orais e insulinas	139 (18,7)	11 (12,1)	0,60 (0,29–1,11)	0,124
Antieméticos, antisecretores	147 (19,8)	27 (29,7)	1,71 (1,04–2,75)	0,030
Psicotrópicos	313 (42,1)	50 (54,9)	1,68 (1,08–2,61)	0,021
Neurolépticos	59 (7,5)	5 (5,5)	0,72 (0,25–1,68)	0,490
Anticoagulantes	84 (10,7)	12 (13,2)	1,27 (0,64–2,35)	0,465
Cirurgias prévias			·	
Cardiovasculares	76 (9,5)	7 (7,7)	0,79 (0,32–1,66)	0,572

Tabela 2 (Continued)

Características	Reinternação em até 30 dias após a alta			Valor-p
	Não (n = 799)	Sim (n = 91)	OR (IC95%)	
Fratura de fêmur	35 (4,4)	2 (2,2)	0,49 (0,08–1,65)	0,333
Câncer	18 (2,3)	3 (3,3)	1,48 (0,34–4,48)	0,537
Abdominal	85 (10,7)	5 (5,5)	0,49 (0,17–1,12)	0,130
Outras cirurgias	109 (13,6)	8 (8,8)	0,61 (0,27–1,22)	0,199
ASA				
1	43 (5,4)	2 (2,2)	_	_
2	487 (61,3)	55 (60,4)	2,43 (0,72–15,14)	0,229
3	235 (29,6)	26 (28,6)	2,38 (0,68–15,10)	0,249
4	30 (3,8)	8 (8,8)	4,73 (0,92–39,80)	0,074

Abreviação: RNI, razão normalizada internacional.

Tabela 3 Modelos múltiplos de fatores associados à reinternação em até 30 dias após a alta e à mortalidade intra-hospitalar

Variáveis	OR	OR (IC95%)	Valor-p
Reinternação em até 30 após a alta) dias		
Intercepto	0,04	(0,01-0,10)	< 0,001
Idade (anos)			
60 a 69	_	_	-
70 a 79	1,87	(0,68-6,62)	0,267
80 a 89	1,54	(0,59-5,30)	0,428
≥ 90	1,86	(0,68-6,57)	0,271
Hipertensão arterial sistêmica	1,71	(1,03-2,96)	0,045
Uso de psicotrópicos	1,74	(1,12-2,72)	0,015
Valor-p H-L	0,870		
Mortalidade intra-hospitalar			
Intercepto	1,17	(0,10-12,23)	0,870
Idade (anos)			
60 a 69	_	_	_
70 a 79	0,64	(0,15-3,31)	0,515
80 a 89	0,57	(0,16-2,68)	0,400
≥ 90 anos ou mais	1,10	(0,31-5,19)	0,909
Doença renal crônica	5,80	(2,64-12,31)	< 0,001
Tempo de internação (dias)	1,06	(1,01-1,10)	0,005
Reinternação em até 30 dias após a alta	3,60	(1,54–7,96)	0,002
Hemoglobina pré-operatória	0,73	(0,61-0,87)	< 0,001
P-valor H-L	0,738		

Abreviações: IC, intervalo de confiança; OR, odds ratio.

para os homens (p < 0,001). Estudos europeus relataram uma média de idade de pacientes com FFP > 80 anos; 10,17 porém, estudos brasileiros relataram uma idade média < 80 anos. 9,13 Idade média maior no sexo feminino foi relatada por vários estudos. 2,9,13

Estudos brasileiros descreverem tempos médios de internação de 8,9 e 12,2 dias.^{8,13} Em Minas Gerais, foi citada uma média de internação de 7,3 dias.⁸ Na Espanha, Prieto-Alhambra et al.¹⁷ encontraram 11,5 dias de tempo médio de internação. No presente estudo, o tempo médio de internação foi de 4,8 dias, menor do que o encontrado na literatura, o que pode ser explicado pelo fato de se tratar de dados de um único hospital privado.

Reinternação em até 30 dias após a alta

A R30 é uma métrica importante por representar a qualidade do cuidado prestado pela unidade hospitalar e por ser um preditor importante de mortalidade. Uma revisão sistemática apontou que a mediana da taxa de reinternação em até 30 dias foi de 10,1%, variando de 4,5 a 23,1% em 22 estudos analisados. De presente estudo obteve uma R30 de 10,2%, valor muito próximo do relatado na revisão sistemática.

A associação entre hipertensão arterial e R30 encontrada no presente estudo corrobora o resultado obtido em estudo americano com > 8.000 pacientes. ¹⁸ Um estudo indiano comparou a densidade mineral óssea (DMO) de pacientes com FFP hipertensos e não hipertensos e observou que os hipertensos apresentavam DMO significativamente menor. ¹⁹ Um estudo americano recente pontuou a hipertensão como fator associado à maior chance de transfusão pós-cirurgia por FFP, sendo a transfusão associada ao maior risco de mortalidade e readmissão. ²⁰ Com os dados destes dois estudos, verifica-se que a hipertensão em pacientes com FFP parece estar associada à maior fragilidade óssea do idoso e à ocorrência de desfecho grave, associado à mortalidade.

O uso de psicotrópicos pode ser uma proxy de depressão, que esteve associada à reinternação em até três meses em um estudo finlandês.¹¹

Tabela 4 Associação entre as características dos pacientes e a mortalidade intra-hospitalar após cirurgia por fratura do terço proximal do fêmur

Características	Mortalidade intra-hospitalar			Valor-p	
	Não (n = 829)	Sim (n = 50)	OR (IC 95%)		
Sexo					
F	651 (78,5)	34 (68,0)	0,58 (0,32–1,10)	0,085	
M	178 (21,5)	16 (32,0)	_	_	
Idade (anos)	83,2 ± 8,2 (84,0)	86,2 ± 8,7 (87,0)	1,05 (1,01–1,09)	0,012	
60 a 69	63 (7,6)	3 (6,0)	_	-	
70 a 79	194 (23,4)	6 (12,0)	0,65 (0,17-3,14)	0,550	
80 a 89	383 (46,2)	21 (42,0)	1,15 (0,38-4,98)	0,823	
≥ 90 anos	189 (22,8)	20 (40,0)	2,22 (0,73-9,65)	0,209	
Estado civil					
Casado	303 (36,7)	16 (32,0)	-	_	
Separado	34 (4,1)	1 (2,0)	0,56 (0,03-2,86)	0,576	
Solteiro	152 (18,4)	4 (8,0)	0,50 (0,14-1,39)	0,220	
Viúvo	337 (40,8)	29 (58,0)	1,63 (0,88-3,13)	0,129	
Tempo de internação (dias)	4,6 ± 4,0 (3,5)	7,7 ± 11,9 (4,4)	1,07 (1,03–1,12)	0,001	
Tempo porta cirurgia (horas)	11,8 ± 7,9 (10,5)	12,2 ± 7,9 (12,7)	1,01 (0,97–1,04)	0,762	
Reinternação em até 30 dias após a alta	80 (9,7)	11 (22,0)	2,64 (1,24–5,19)	0,007	
Hemoglobina pré-operatória	12,4 ± 1,7 (12,6)	11,3 ± 1,6 (11,6)	0,73 (0,62-0,85)	< 0,001	
Hemoglobina pós-operatória	9,8 ± 1,8 (9,7)	8,8 ± 1,5 (8,6)	0,70 (0,58-0,84)	< 0,001	
RNI	1,2 ± 0,4 (1,1)	1,3 ± 0,6 (1,1)	1,35 (0,74–2,11)	0,248	
Tipo de fratura					
Pertrocantérica	733 (88,4)	49 (98,0)	6,42 (1,38–114,25)	0,067	
Colo de fêmur	96 (11,6)	1 (2,0)	_	_	
Procedimento realizado					
Artroplastia	17 (2,1)	1 (2,0)	_	_	
Osteossíntese	812 (97,9)	49(98,0)	1,03 (0,20–18,67)	0,980	
Comorbidades					
Hipertensão	563 (67,9)	27 (69,2)	1,07 (0,54-2,21)	0,863	
Diabetes mellitus	167 (20,1)	7 (17,9)	0,87 (0,35–1,89)	0,738	
Doença renal crônica	61 (7,4)	14 (35,9)	7,05 (3,41–14,10)	< 0,001	
Doenças respiratórias	52 (6,3)	5 (12,8)	2,20 (0,73-5,39)	0,115	
Doenças cardiovasculares	298 (35,9)	18 (46,2)	1,53 (0,79–2,91)	0,198	
Distúrbios psiquiátricos	78 (9,4)	3 (7,7)	0,80 (0,19-2,29)	0,719	
Doenças neurológicas	155 (18,7)	6 (15,4)	0,79 (0,29–1,79)	0,604	
Doenças endocrinológicas	151 (18,2)	7 (17,9)	0,98 (0,39–2,14)	0,966	
Medicamentos					
Anti-hipertensivos	525 (66,6)	26 (72,2)	1,30 (0,64–2,87)	0,486	
Antidiabéticos orais e insulinas	143 (18,1)	7 (19,4)	1,09 (0,43-2,40)	0,844	
Antieméticos, antisecretores	160 (20,3)	11 (30,6)	1,73 (0,80-3,50)	0,142	
Psicotrópicos	339 (43,0)	20 (55,6)	1,66 (0,85-3,29)	0,143	
Neurolépticos	59 (7,1)	3 (7,7)	1,09 (0,26-3,13)	0,892	
Anticoagulantes	93 (11,2)	3 (7,7)	0,66 (0,16-1,87)	0,496	

Tabela 4 (Continued)

Características	Mortalidade intra-hospitalar			Valor-p
	Não (n = 829)	Sim (n = 50)	OR (IC 95%)	
Cirurgias prévias				
Cardiovasculares	73 (8,8)	8 (16,0)	1,97 (0,83–4,15)	0,093
Fratura de fêmur	33 (4,0)	3 (6,0)	1,54 (0,36–4,50)	0,487
Câncer	19 (2,3)	2 (4,0)	1,78 (0,28–6,36)	0,449
Abdominal	83 (10,0)	5 (10,0)	1,00 (0,34–2,36)	0,996
Outras cirurgias	111 (13,4)	3 (6,0)	0,41 (0,10-1,15)	0,143
ASA				
1	39 (4,7)	5 (10,0)	_	_
2	514 (62,3)	18 (36,0)	0,27 (0,10-1,06)	0,065
3	238 (28,8)	23 (46,0)	0,75 (0,29–2,35)	0,589
4	34 (4,1)	4 (8,0)	0,92 (0,21–3,74)	0,904

Abreviação: RNI, razão normalizada internacional.

Mortalidade Intra-hospitalar

A taxa de mortalidade intra-hospitalar encontrada no presente estudo foi de 5,7%, sendo de 8,1% entre os homens e de 4,9% entre as mulheres (p=0,117), valores que corroboram a literatura tanto de estudos brasileiros quanto internacionais. Estudos realizados no sul do Brasil obtiveram uma taxa de MIH de 4,3 a 7,5%, 9,13 enquanto estudos europeus relataram 2,1 e 3,8%. 10,17 Uma maior taxa de mortalidade entre os homens foi apontada por estudos prévios. 8,21

A associação da DRC com a mortalidade foi descrita por um estudo espanhol² e um estudo americano,¹⁵ e a DRC foi também causa de readmissão de 2,4% dos casos descritos em um estudo italiano.¹⁰ A falha renal foi apontada como complicação da cirurgia de FFP em 14,1% dos casos.¹⁷ A relação de DRC com maior chance de MIH encontrada neste estudo pode então ser explicada por ser uma possível evolução de uma complicação da cirurgia e por ser causa de reinternação, outro fator independente associado à MIH. No presente estudo, a DRC não se associou diretamente à R30.

Maior tempo de internação esteve associado com maior chance de MIH na nossa amostra. A associação da MIH com a internação ainda é pouco descrita na literatura, mas esperase que os idosos com tempo maior de internação apresentem quadros mais graves, o que explicaria uma maior chance de óbito. Alguns estudos abordam o tempo até a cirurgia como fator de risco para mortalidade, 1,13-15 o que não foi observado no presente estudo. Uma hipótese seria o fato de o tempo de espera até a cirurgia ser baixo no presente estudo (média de ~12 horas), por se tratar de um hospital privado.

Kates et al.²² relataram que 18,6% dos pacientes morrem durante a reinternação. Como foi demonstrado com os dados do presente estudo, os fatores associados à reinternação sugerem um perfil de idoso mais frágil, portador de doença crônica e em uso de vários medicamentos. Este cenário poderia ser uma hipótese para a associação entre a R30 e a MIH demonstrada na nossa amostra. Valores baixos de hemoglobina se associam à anemia, que é um importante

fator de risco para hospitalização, morbidade e mortalidade em idosos,²³ portanto a relação de maiores valores de hemoglobina pré-operatória com menor chance de mortalidade é coerente com a literatura.

O presente estudo teve como limitação o fato de ser uma busca retrospectiva de dados de prontuários, de modo que só poderiam ser utilizadas as variáveis disponíveis, de modo que não foi possível avaliar informações importantes, como o status de independência funcional, o índice de massa corporal, tabagismo e etilismo. Outro ponto limitante é o fato de ser um estudo unicêntrico, o que não permite a generalização de resultados.

Conclusão

No presente artigo, foram avaliados fatores associados aos desfechos R30 e à MIH em uma coorte de 896 pacientes ≥ 60 anos de idade diagnosticados com FFP e submetidos a tratamento cirúrgico. Os resultados do presente estudo levantam a hipótese de que a ocorrência destes desfechos está associada à presença de comorbidades, uso de medicamentos e o valor da hemoglobina pré-operatória.

Suporte Financeiro

O presente estudo não recebeu nenhum suporte financeiro de fontes públicas, comerciais ou sem fins lucrativos

Conflito de Interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Referências

- 1 Xu BY, Yan S, Low LL, Vasanwala FF, Low SG. Predictors of poor functional outcomes and mortality in patients with hip fracture: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord 2019;20(01):568
- 2 Guzon-Illescas O, Perez Fernandez E, Crespí Villarias N, et al. Mortality after osteoporotic hip fracture: incidence, trends, and associated factors. J Orthop Surg Res 2019;14(01):203

- 3 Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet 2002;359(9319):1761–1767
- 4 Wei J, Zeng L, Li S, Luo F, Xiang Z, Ding Q. Relationship between comorbidities and treatment decision-making in elderly hip fracture patients. Aging Clin Exp Res 2019;31(12):1735–1741
- 5 Cooper C, Campion G, Melton LJ III. Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporos Int 1992;2(06):285–289
- 6 Gullberg B, Johnell O, Kanis JA. World-wide projections for hip fracture. Osteoporos Int 1997;7(05):407–413
- 7 Kanis JÁ, Odén A, McCloskey EV, Johansson H, Wahl DA, Cooper CIOF Working Group on Epidemiology and Quality of Life. A systematic review of hip fracture incidence and probability of fracture worldwide. Osteoporos Int 2012;23(09):2239–2256
- 8 Peterle VCU, Geber JC, Darwin W, Lima AV, Bezerra PE, Novaes MRCG. Indicators of morbidity and mortality by femur fractures in older people: a decade-long study in brazilian hospitals. Acta Ortop Bras 2020;28(03):142–148
- 9 Silva DMW, Lazaretti-Castro M, Freitas Zerbini CA, Szejnfeld VL, Eis SR, Borba VZC. Incidence and excess mortality of hip fractures in a predominantly Caucasian population in the South of Brazil. Arch Osteoporos 2019;14(01):47
- 10 Di Giovanni P, Di Martino G, Zecca IA, Porfilio I, Romano F, Staniscia T. Incidence of hip fracture and 30-day hospital readmissions in a region of central Italy from 2006 to 2015. Geriatr Gerontol Int 2019;19(06):483–486
- 11 Yli-Kyyny TT, Sund R, Heinänen M, Malmivaara A, Kröger H. Risk factors for early readmission due to surgical complications after treatment of proximal femoral fractures A Finnish National Database study of 68,800 patients. Injury 2019;50(02):403–408
- 12 Ali AM, Gibbons CER. Predictors of 30-day hospital readmission after hip fracture: a systematic review. Injury 2017;48(02):243–252
- 13 Ribeiro TA, Premaor MO, Larangeira JA, et al. Predictors of hip fracture mortality at a general hospital in South Brazil: an unacceptable surgical delay. Clinics (Sao Paulo) 2014;69(04):253–258

- 14 Hu F, Jiang C, Shen J, Tang P, Wang Y. Preoperative predictors for mortality following hip fracture surgery: a systematic review and meta-analysis. Injury 2012;43(06):676–685
- 15 Endo A, Baer HJ, Nagao M, Weaver MJ. Prediction model of in. hospital mortality after hip fracture surgery. J Orthop Trauma 2018;32(01):34–38
- 16 Ram GG, Govardhan P. In-Hospital Mortality following Proximal Femur Fractures in Elderly Population. Surg J (NY) 2019;5(02): e53–e56
- 17 Prieto-Alhambra D, Reyes C, Sainz MS, et al. In-hospital care, complications, and 4-month mortality following a hip or proximal femur fracture: the Spanish registry of osteoporotic femur fractures prospective cohort study. Arch Osteoporos 2018;13 (01):96
- 18 Basques BA, Bohl DD, Golinvaux NS, Leslie MP, Baumgaertner MR, Grauer JN. Postoperative length of stay and 30-day readmission after geriatric hip fracture: an analysis of 8434 patients. J Orthop Trauma 2015;29(03):e115-e120
- 19 Dhibar DP, Gogate Y, Aggarwal S, Garg S, Bhansali A, Bhadada SK. Predictors and outcome of fragility hip fracture: a prospective study from North India. Indian J Endocrinol Metab 2019;23(03): 282–288
- 20 Arshi A, Lai WC, Iglesias BC, et al. Blood transfusion rates and predictors following geriatric hip fracture surgery. Hip Int 2021; 31(02):272–279
- 21 Guerra TEM, Viana RD, Feil L, Feron ET, Maboni J, Vargas ASG. Oneyear mortality of elderly patients with hip fracture surgically treated at a hospital in Southern Brazil. Rev Bras Ortop 2017;52 (01):17–237
- 22 Kates SL, Behrend C, Mendelson DA, Cram P, Friedman SM. Hospital readmission after hip fracture. Arch Orthop Trauma Surg 2015;135(03):329–337
- 23 Goodnough LT, Schrier SL. Evaluation and management of anemia in the elderly. Am J Hematol 2014;89(01):88–96