

Erratum vom 22.03.2010 zum Beitrag Bussfeld P, Czekalla J. „Therapieadhärenz bei Multipler Sklerose und Schizophrenie – Ein Vergleich von Therapieadhärenzraten und Verbesserungsansätzen in der Therapie zweier schubförmiger, chronischer Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Fortschr Neurol Psychiat 2010; 78: 139 – 146“

In Tabelle 4 wurde eine Angabe vertauscht. Nachstehend finden Sie die korrigierte Tabelle.

Der Verlag entschuldigt sich für das Versehen.

Tab. 4 Adhärenz zu antipsychotischer Medikation, Gebrauch von Depotantipsychotika, psychotische Symptome, Rückfälle und stationäre Einweisungen im Lauf von 2 Jahren (nach Morken et al. 2008 [45]).

	Adhärenz unter oralen Antipsychotika		Verwendung von Depotantipsychotika	
	gut N = 28	nicht gut N = 22	Gebrauch N = 12	kein Gebrauch N = 38
persistierend psychotisch	4 (14%)	9 (41%)	5 (42%)	8 (21%)
Rückfall	3 (11%)	14 (64%)	8 (67%)	9 (24%)
stationäre Einweisung	9 (32%)	11 (50%)	7 (58%)	13 (34%)